

HCU ANAMIX INFANT

Aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste homokystinurian (HCU) ruokavaliohoitoon imeväisille

Jauhemainen aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste homokystinurian (HCU)/CBS-puutoksen tai hypermetioninemian ruokavaliohoitoon imeväisille. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien yhteen ikävuoteen asti. Soveltuu täydennysravinnoksi alle 3-vuotiaille.

HCU Anamix Infant sisältää välttämättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraattia, rasvaa, kuituja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Lisätty pitkäketjuisia rasvahappoja (LCP), arakinoidihappoa (ARA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) rintamaitoa vastaavilla tasoilla.

- Ei sisällä metioniinia.
- Lisätty prebioottisia oligosakkarideja GOS/FOS.

- rasvat auringonkukkaöljystä, kookosöljystä, rapsiöljystä ja Cryptocodinium cohnii- ja Mortierella alpina -öljyistä, joissa runsaasti ARA:a ja DHA:ta (44 E%)
- hiilihydraatit glukoosisiirapista (43 E%)
- 0,56 g ravintokuitua galakto-oligo- ja frukto-oligosakkariideista (GOS/FOS, 2 E%)



**PER 100 ML
(15 g/100 ml laimennos)**

70 kcal energiaa

7,5 g hiilihydraatteja

3,5 g rasvaa

2,0 g proteiiniekvivalenteja

Ainesosat

Glukoosisiirappi, kasviöljyjä (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, kookos-, rapsi ja auringonkukkaöljy), galakto-oligosakkarideja (lehmänmaidosta), L-lysiini-Lglutamaatti,L-leusiini, L-proliini, L-arginiini, L-valiini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), L-isolesiini, glysiini, kalsiumfosfaatti, L-asparagiinihappo, L-treoniini, L-seriini, L-fenyylialaniini, kaliumsitraatti, L-alaniini, L-histidiini, frukto-oligosakkarideja, kalsiumkloridi, koliinibitarraatti, L-kystiini, magnesiumasetaatti, kalsiumglyserofosfaatti, L-tryptofaani, natriumvetyfosfaatti, Cryptecodinium Cohnii -öljy, Mortierella alpina -öljy, natriumkloridi, L-glutamiini, inositoli, L-glutamiinihappo, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoaineet (auriongonkukkalesiitiini, askorbylipalmitaatti), tauriini, ferrosulfaatti, sinkkisolfaatti, L-karnitiini, DL-α-tokoferyylisetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, retinyyliasetaatti, kaliumjodidi, mangaanisulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, fytomenadioni, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

Gluteeniton. Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa.

Makuvaihtoehdot

Neutraalinmakuinen

Indikaatit

Imeväisten kliininen ravintovalmiste homokystinurean (HCU)/ CBS-puutoksen tai hypermetioninemian ruokavalihoitoon. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien 1 ikävuoteen saakka. Voidaan käyttää myös täydennysravintovalmisteena 3-vuotiaaksi.

Annostus

Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määrittyy potilaan iän, painon ja sairaustilan pohjalta.

Huomioitavaa

Tuotetta on täydennettävä luonnollisella proteiinilla, kuten esimerkiksi rintamaidolla tai sopivalla äidinmaidonkorvikkeella hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaisesti, metioniinia sisältävien proteiinilähteiden korvaamiseksi. Ei parenteraaliseen käyttöön. Ei sovellu ainoaksi ravinnoksi.

Valmistus

Käytä aina pakkauksen mukana olevaa mittalusikkaa oikean annoksen saamiseksi. Lisää jokaista mittaussusikkaa kohden (5 g) 30 ml vettä suositellun laimennuksen saavuttamiseksi (15 % paino/kokonaismäärä).

Laimeampi sekoitussuhde alussa saattaa olla tarpeen hyvän toleranssin varmistamiseksi. Jauhe ei ole steriili, joten se on valmistettava välittömästi ennen ruokintaa. Seosta ei saa kuumentaa yli 15 minuuttia, eikä sitä saa keittää tai lämmittää mikroaaltouunissa. Seos, jota ei syödä tunnin kuluttua valmistamisesta, on heitettävä pois.

- 1. Pese kädet hyvin ja puhdista valmistusalue. Steriloi pullot ja tutit.
- 2. Keitä tuoretta vettä 5 minuutin ajan tai kunnes vedenkeitin sammuu (älä koskaan käytä lämmintä vesijohtovettä). Yli vuoden ikäisille lapsille vettä ei tarvitse kiehua, jos veden laatu on hyvä. Jauhe liukenee parhaiten lämpimään veteen.
- 3. Jäähdytä vettä vähintään 30 minuutin ajan, kunnes se tuntuu sopivalta ranteen sisäpuolelle mitattuna. Kaada haluttu määrä vettä steriloihtuun tuppulpoon/astiaan.
- 4. Lisää veteen suositeltu mittalusikkamäärä jauhetta.
- 5. Ravista tai sekoita vispilällä, kunnes jauhe on liennut.
- 6. Tarkista seoksen oikea lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteen sisäpuolelle. Vesi tai muut laimennetut juomat tulee nauttia samanaikaisesti.

Säilytys

Avattu pakkaus käytettävä 2 viikon sisällä. Säilytä kuivassa ja viileässä poissa suoralta auringon valolta. Sulje purkki kannella aina käytön jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkaus

Kansi on helppo avata ja sulkea uudestaan. Jätelajittelu: Jauhemaisten valmisteiden purkit lajitellaan keräysmetalliin. Muovikannet hävitetään polttokelpoisena jätteenä. Ulkokartongit kuuluvat keräyskartonkiin.

Korvattavuus

503

Tilattavissa Tamrosta.

Tilausnumero	Tuote	Myyntiyksikkö	Koodi
2110633	HCU Anamix Infant	400 g	

Ravintosisältö

		Per 100 g	Per 100 ml 15 % laimennos
Energia	kJ	1950	293
	kcal	466	70
Rasva (44 E%)	g	23,0	3,5
- tyydytynyttä	g	7,7	1,2
- kertatyydyttymätöntä	g	11,3	1,7
- monityyydyttymätöntä	g	4,0	0,6
-- linolihappo (LA)	g	3,21	0,481
-- alfa-linoleenihappo (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonihappo (AA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaenihappo (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-suhde		7,66:1	
Hiilihydraatit (43 E%)	g	50,1	7,5
- sokerit	g	7,5	1,1
Ravintokuitu (2 E%)	g	3,7	0,56
- liukoinen	g	3,7	0,56
- liukenematon	g	0	0
Proteiiniekvivalentti (11 E%)	g	13,1	2
Suola	g	0,48	0,07
Aminohapot	g	15,5	2,3
L-alaniini	g	0,64	0,096
L-arginiini	g	1,09	0,164
L-asparagiinihappo	g	0,93	0,140
L-kystiini	g	0,41	0,0615
L-glutamiini	g	0,13	0,0195
Glysiini	g	0,99	0,149
L-histidiini	g	0,62	0,093
L-isolesiini	g	0,98	0,147
L-leusiini	g	1,67	0,251
L-lysiini	g	1,14	0,171
L-metioniini	g	ei sisällä	ei sisällä
L-fenyylialaniini	g	0,74	0,111
L-proliini	g	1,18	0,1777
L-seriini	g	0,73	0,110
L-treoniini	g	0,82	0,123
L-tryptofaani	g	0,33	0,0495
L-tyrosiini	g	0,74	0,111
L-valiini	g	1,07	0,161
Vitamiinit			
A-vitamiini	µg	408	61,2
D3-vitamiini	µg	11,2	1,68
E-vitamiini	mg (mg TE)	11,5 (9,23)	1,73 (1,38)
K-vitamiini	µg	37,3	5,59
C-vitamiini	mg	48,9	7,34
Tiamiini	mg	0,51	0,08
Riboflaviini	mg	0,51	0,08
Niasiini	mg (mg NE)	2,33 (7,83)	0,35 (1,17)
Pantoteenihappo	mg	2,81	0,42
B6-vitamiini	mg	0,51	0,08
Foolihappo/Folaatti	µg	55,0 / 91,7	8,25 / 13,8
B12-vitamiini	µg	1,21	0,18
Biotiini	µg	18,2	2,73
Kivennäisaineet ja hivenaineet			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Kloridi	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfori	mg (PO4 mmol)	300 (9,69)	45 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Rauta	mg	7,92	1,19
Sinkki	mg	5,59	0,84
Kupari	mg	0,42	0,063
Mangaani	mg	0,029	0,004
Molybdeeni	µg	12,1	1,82
Seleen	µg	17,7	2,66
Kromi	µg	14,0	2,10
Jodi	µg	97,9	14,7
Muut			
L-karnitiini	mg	10,1	1,52
Koliini	mg	146	21,9
Inositoli	mg	97,9	14,7
Tauriini	mg	30,0	4,50
Osmoliteetti	mOsm/kg H2O		380

Nutrician valmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, joita käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjeiden mukaan.

Nutricia c/o Danone Oy | Puh 02 274 4111 | nutriciasuomi@danone.com | ammattilaiset.nutricia.fi