

IVA ANAMIX INFANT

Aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste isovaleerihappovirtsaisuuden (IVA-taudin) ruokavaliohoitoon

Jauhemainen aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste IVA-taudin (isovaleerihappovirtsaisuuden) ruokavaliohoitoon tai muihin todennettuihin leusiiniaineenvaihdunnan häiriöihin. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien yhteen ikävuoteen asti. Soveltuu täydennysravinnoksi alle 3-vuotiaille.

IVA Anamix Infant sisältää välttämättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraattia, rasvaa, kuituja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Lisätty pitkäketjuisia rasvahappoja (LCP), arakinoidihappoa (ARA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) rintamaitoa vastaavilla tasoilla.

- Ei sisällä leusiinia.
- Lisätty prebioottisia oligosakkarideja GOS/FOS.

- rasvat auringonkukka-, soija-, kookos-, rapsi ja xxxöljystä (encellsolja) sekä runsaasti ARA:a ja DHA:ta (44 E%)
- hiilihydraatit glukoosisiirapista (43 E%)
- 0,56 g ravintokuitua galakto-oligo- ja frukto-oligosakkariideista (GOS/FOS, 2 E%)



PER 100 ML

70 kcal energiaa

7,5 g hiilihydraatteja

3,5 g rasvaa

2,0 g proteiiniekvivalentteja

Ainesosat

Glukoosisiirappi, kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy, kookosöljy, rapsiöljy, auringonkukkaöljy, galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), L-Lysiini-L-glutamaatti, L-proliini, gliysiini, L-arginiini, emulgointiaineet (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), L-asparagiinihappo, kalsiumfosfaatti, L-tyrosiini, L-fenyylialaniini, L-alaniini, Ltreoniini, L-histidiini, L-seriini, kaliumsitraatti, frukto-oligosakkaridit, L-valiini, kaliumkloridi, L-kystiini, L-isoleusiini, koliinibitarraatti, magnesiumasettaatti, kalsiumglyserofosfaatti, natriumvetyfosfaatti, L-metioniini, L-glutamiinihappo, Ltryptofaani, Crypthecodinium cohnii -öljy, *Mortierella alpina* -öljy, natriumkloridi, L-glutamiini, inositoli, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoaineet (aurin-gonkukkalesiitiini, askorbyyilipalmiitaatti), tauriini, ferrosulfaatti, sinkkisulfaatti, L-karnitiini, DL- α -tokoferyyliasettaatti, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, retinyyliasettaatti, kaliumjodidi, mangaanisulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, fytomenadioni, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syankobalamiini.

Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa.

Indikaatiot

Ei sovellu käytettäväksi ainoana proteiinin lähteenä, vaan tämän valmisteen ohella on turvattava leusiinin saanti muista lähteistä (esimerkiksi rintamaidolla tai äidinmaidonkorvikkeella), sekä nesteen ja muiden ravintoaineiden päivittäinen tarve lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan

Annostus

Noudata lääkärin tai ravitsemusterapeutin määräämää annostusta ja laimennosta. Annostus riippuu potilaan iästä, painosta ja lääketieteellisestä tilasta. Jokaista mittalusikallista (5 g) kohden tarvitaan 30 ml vettä suositellun pitoisuuden saavuttamiseen. Suositeltu laimennos on 15% paino/tilavuus (esim. 15 g jauhetta (3 mittalusikallista) ja 90 ml vettä, jotta saadaan 100 ml valmista liuosta. Osmolaliteetti tällä pitoisuudella on 380 mOmol/kg H₂O.

Huomioitavaa

Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön. Käytettävä hoitavan lääkärin valvonnassa. Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Tarkoitettu imeväisikäisille 12 kuukauden ikään saakka sekä soveltuu käytettäväksi täydennysravintona 3 ikävuoteen saakka.

Valmistus

Potilaan terveyden kannalta on tärkeää noudattaa huolellisesti pakkauksessa olevia valmistusohjeita.

- 1. Pese kädet huolellisesti ja puhdista valmistusalausta ja tarvittavat astiat.
- 2. Keitä raikasta kylmää vesijohtovettä noin 5 minuuttia, ja sen jälkeen anna veden jäähtyä noin 30 minuuttia, niin että se tuntuu käteen syönteilämpöiseltä. Mittaa puhtaaseen tuttipulloon tarvittava määrä vettä.
- 3. Tasoita jauhe mittalusikkaan puhtaan ja kuivan veitsen selkämyksellä. Älä paina jauhetta mittalusikkaan. Käytä ainoastaan pakkauksessa olevaa mittalusikkaa.
- 4. Lisää tarvittava määrä jauhetta tuttipulloon. Sulje pullon korkki ja ravista, kunnes jauhe liukenee. Ennen syöttämistä varmista muutamalla tipalla ranteen sisäpintaan, että liuos on oikean lämpöistä.
- 5. Käytä heti valmistuksen jälkeen. Heitä pois jäljelle jäänyt syöttämättä jäänyt valmiste. Liuosta ei saa lämmittää uudelleen syötön aikana.

Säilytys

Kuivassa, normaalissa huoneenlämmössä. Sulje aina kansi käytön jälkeen Käytä kahden viikon kuluessa avaamisesta. Pakattu suojakaasuun.

Pakkaus

Kansi on helppo avata ja sulkea uudestaan. Jätelajittelu: Jauhemaisten valmisteiden purkit lajitellaan keräysmetalliin. Muovikannet hävitetään polttokelpoisena jätteenä. Ulkokartongit kuuluvat keräyskartonkiin.

Korvattavuus

503

Tilattavissa Tamrosta.

Tilausnumero	Tuote	Myyntiyksikkö
2205607	IVA Anamix Infant	400 g

Ravintosisältö

		Per 100 g	Per 100 ml 15 % laimennos
Energia	kJ	1950	293
	kcal	466	70
Rasva (44 E%)	g	23	3,5
- tyydytynyttä	g	7,5	1,1
- kertatyydyttymätöntä	g	9,4	1,4
- monityyydyttymätöntä	g	5,0	0,75
-- linoli-happo (LA)	g	4,1	0,62
-- alfa-linoleenihappo (ALA)	g	0,66	0,1
-- arakidonihappo (AA)	mg	140	20
-- dokosaheksaenihappo (DHA)	mg	70	10
n6:n3-suhde		5,9:1	
Hiilihydraatit (43 E%)	g	49,8	7,5
- sokerit	g	7,3	1,1
Ravintokuitu (2 E%)	g	3,7	0,56
- liukoinen	g	3,7	0,56
- liukenematon	g	0	0
Proteiiniekvivalentti (11 E%)	g	13,1	2
Suola	g	0,5	0,07
Aminohapot	g	15,5	2,3
L-alaniini	g	0,74	0,11
L-arginiini	g	1,21	0,18
L-asparagiinihappo	g	1,02	0,15
L-kystiini	g	0,44	0,07
L-glutamiini	g	0,11	0,02
Glysiini	g	2,18	0,33
L-histidiini	g	0,7	0,1
L-isoleusiini	g	0,42	0,06
L-leusiini	g	ei sisällä	ei sisällä
L-lysiini	g	1,06	0,16
L-metioniini	g	0,3	0,04
L-fenyylialaniini	g	0,82	0,12
L-proliini	g	2,19	0,33
L-seriini	g	0,68	0,1
L-treoniini	g	0,72	0,1
L-tryptofaani	g	0,27	0,04
L-tyrosiini	g	0,8	0,12
L-valiini	g	0,48	0,07
Vitamiinit			
A-vitamiini	µg-RE	392	58,8
D ₃ -vitamiini	µg	8,7	1,3
E-vitamiini	mg a-TE	4,6	0,69
K-vitamiini	µg	37,2	5,6
C-vitamiini	mg	49	7,4
Tiamiini	mg	0,5	0,08
Riboflaviini	mg	0,5	0,08
Niasiini	mg-NE	6,7	1,0
Pantoteenihappo	mg	2,8	0,42
B ₆ -vitamiini	mg	0,5	0,08
Foolihappo/Folaatti	µg	55	8,3
B ₁₂ -vitamiini	µg	1,2	0,18
Biotiini	µg	18,2	2,7
Kivennäisaineet ja hivenaineet			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,3)	28,7 (1,2)
Kalium	mg (mmol)	501 (12,8)	75,2 (1,9)
Kloridi	mg (mmol)	355 (10,1)	53,3 (1,5)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,5)
Fosfori	mg (PO ₄ mmol)	300 (9,7)	45 (1,5)
Magnesium	mg (mmol)	58 (2,4)	8,7 (0,36)
Rauta	mg	8,1	1,2
Sinkki	mg	5,7	0,86
Kupari	mg	0,43	0,06
Mangaani	mg	0,43	0,06
Molybdeeni	µg	12	1,8
Seleen	µg	15,5	2,3
Kromi	µg	13,8	2,1
Jodi	µg	83	12,5
Muut			
L-karnitiini	mg	10	1,5
Koliini	mg	91	13,7
Inositoli	mg	98	14,7
Tauriini	mg	30	4,5
Osmolaliteetti	mOsmol/kg H ₂ O		380

Nutrician valmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, joita käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjeiden mukaan.

Nutricia c/o Danone Oy | Puh 02 274 4111 | nutriciasuomi@danone.com | ammattilaiset.nutricia.fi