

MSUD ANAMIX INFANT

Aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste MSUD-taudin (Maple Syrup Urine Disease eli vaahterasiirappitaudin) ruokavaliohoitoon.

Jauhemainen aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste vaahterasiirappitaudin (MSUD) ruokavaliohoitoon. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien yhteen ikävuoteen asti. Soveltuu täydennysravinnoksi alle 3-vuotiaille.

MSUD Anamix Infant sisältää välttämättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraattia, rasvaa, kuituja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Lisätty pitkäketjuisia rasvahappoja (LCP), arakinoidihappoa (ARA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) rintamaitoa vastaavilla tasoilla.

- Ei sisällä leusiinia, isoleusiinia ja valiinia.
- Lisätty prebioottisia oligosakkarideja GOS/FOS.

- rasvat auringonkukka-, kookos-, ja rapsiöljystä sekä Cryptocodium cohnii- ja Mortierella alpina -öljyistä, joissa on runsaasti ARA:a ja DHA:ta (44 E%)
- hiilihydraatit glukoosisiirapista (43 E%)
- 0,56 g ravintokuitua galakto-oligo- ja frukto-oligosakkarideista (GOS/FOS, 2 E%)



PER 100 ML

70 kcal energiaa

3,5 g rasvaa

7,5 g hiilihydraatteja

2,0 g proteiiniekvivalentteja

Ainesosat

Glukoosisiirappi, kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, kookos-, rapsi- ja auringonkukkaöljy), galakto-oligosakkaridit (lehmänmaidosta), L-lysiini-L-glutamaatti, L-proliini, L-arginiini, glysiini, L-asparagiinihappo, L-treoniini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), L-fenyylialaniini, L-tyrosiini, L-seriini, kalsiumfosfaatti, L-histidiini, L-alaniini, kaliumsitraatti, L-kysteiini, frukto-oligosakkaridit, kaliumkloridi, L-tryptofaani, koliinibitartaatti, magnesiumasettaatti, L-metioniini, kalsiumglyserofosfaatti, natriumvetyfosfaatti, *Cryptocodium Cohnii*-öljy, *Mortierella alpina*-öljy, natriumkloridi, L-glutamiini, inositoli, L-glutamiinihappo, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoaineet (aurionkukkalesitiini, askorbylipalmitaatti), tauriini, ferrosulfaatti, sinkkisulfaatti, L-karnitiini, DL- α -tokoferyyliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinivetykloridi, pyridoksiinivetykloridi, riboflaviini, retinyyliasetaatti, kaliumjodidi, mangaani-sulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, fytomenadioni, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini. Gluteeniton. Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa.

Makuvaihtoehdot

Neutraalinmakuinen

Käyttö

Imeväisten kliininen ravintovalmiste MSUD-taudin ruokavalihoitoon. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien 1 ikävuoteen saakka. Voidaan käyttää myös täydennysravintovalmisteenä 3-vuotiaaksi.

Annostus

Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määrätty potilaan iän, painon ja sairaustilan pohjalta.

Huomioitavaa

Valmisteen ohella on turvattu isoleusiinin, leusiinin ja valiinin saanti muista lähteistä (esimerkiksi rintamaidolla tai äidinmaidonkorvikkeella), sekä nesteen ja muiden ravintoaineiden päivittäinen tarve lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön. Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi.

Valmistus

Käytä aina pakkauksen mukana olevaa mittalusikkaa oikean annoksen saamiseksi. Lisää jokaista mittaussusikaa kohden (5 g) 30 ml vettä suositellun laimennuksen saavuttamiseksi (15 % paino/kokonaismäärä).

Laimeampi sekoitussuhde alussa saattaa olla tarpeen hyvän toleranssin varmistamiseksi. Jauhe ei ole steriili, joten se on valmistettava välittömästi ennen syöttämistä. Seosta ei saa keittää tai lämmittää mikroaaltouunissa. Seos, jota ei syödä tunnin kuluessa valmistamisesta, on heitettävä pois.

1. Pese kädet ja puhdista valmistusalue. Steriloi pullot ja tutit.
2. Keitä tuoretta vettä 5 minuutin ajan tai kunnes vedenkeitin sammuu (älä koskaan käytä lämmintä vesijohtovettä). Yli vuoden ikäisille lapsille vettä ei ole tarpeen kiehua, jos veden laatu on hyvä. Jauhe liukenee parhaiten lämpimään veteen.
3. Jäähdytä vettä vähintään 30 minuutin ajan kunnes se tuntuu ranteen sisäpuolelta sopivalta. Kaada haluttu vesimäärä steriloituun tuppulpoon tai astiaan.
4. Lisää veteen suositeltu mittalusikkamäärä jauhetta.
5. Ravista tai sekoita vispilällä, kunnes jauhe on liennut.
6. Tarkista seoksen oikea lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteen sisäpuolelle. Vesi tai muut laimennetut juomat tulisi ottaa samanaikaisesti.

Säilytys ja säilyvyys

Avattu pakkaus käytettävä 2 viikon sisällä. Säilytä kuivassa ja viileässä poissa suoralta auringon valolta. Sulje purkki kannella käytön jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkaus

Kansi on helppo avata ja sulkea uudestaan. Jätelajittelu: Jauheasteiden valmis-teiden purkit lajitellaan keräysmetalliin. Muovikannet hävitetään polttokelpoisena jätteenä. Ulkokartongit kuuluvat keräyskartonkiin.

Korvattavuus

Synnyttäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

Tilattavissa Tamrosta.

Tilausnumero	Tuote	Myyntiyksikkö
2380368	MSUD Anamix Infant	400 g

Ravintosisältö

		Per 100 g	Per 100 ml 15 % laimennos
Energia	kJ	1950	293
	kcal	466	70
Rasva 44 E%	g	23,0	3,5
- tyydytynyttä	g	7,7	1,2
- kertatyydyttymätöntä	g	11,3	1,7
- monityyydyttymätöntä	g	4,0	0,6
-- linolihappo (LA)	g	3,21	0,481
-- alfaolenihappo (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonihappo (AA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaenihappo (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-suhde		7,66:1	
Hiilihydraatit 43 E%	g	50,1	7,5
- sokereita	g	7,5	1,1
Ravintokuitu 2 E%	g	3,7	0,56
- liukoinen	g	3,7	0,56
- liukenematon	g	0	0
Proteiiniekvivalentti 11 E%	g	13,1	2,0
Suola	g	0,48	0,07
Aminohapot			
L-alaniini	g	0,82	0,123
L-arginiini	g	1,40	0,210
L-asparagiinihappo	g	1,20	0,180
L-kystiini	g	0,52	0,078
L-glutamiini	g	1,60	0,240
Glysiini	g	1,29	0,194
L-histidiini	g	0,80	0,120
L-isoleusiini	g	ei sisällä	ei sisällä
L-leusiini	g	ei sisällä	ei sisällä
L-lysiini	g	1,45	0,218
L-metioniini	g	0,34	0,051
L-fenyylialaniini	g	0,94	0,141
L-proliini	g	1,56	0,234
L-seriini	g	0,94	0,141
L-treoniini	g	1,05	0,158
L-tryptofaani	g	0,42	0,063
L-tyrosiini	g	0,94	0,141
L-valiini	g	ei sisällä	ei sisällä
Vitamiinit			
A-vitamiini	µg	408	61,2
D ₃ -vitamiini	µg	11,2	1,68
E-vitamiini	mg (mg TE)	11,5 (9,23)	1,73 (1,38)
K-vitamiini	µg	37,3	5,59
C-vitamiini	mg	48,9	7,34
Tiamiini	mg	0,51	0,08
Riboflaviini	mg	0,51	0,08
Niasiini	mg (mg NE)	2,33 (9,33)	0,35 (1,40)
Pantoteenihappo	mg	2,81	0,42
B ₆ -vitamiini	mg	0,51	0,08
Foolihappo/Folaatti	µg	55,0/91,7	8,25/13,8
B ₁₂ -vitamiini	µg	1,21	0,18
Biotiini	µg	18,2	2,73
Kivennäisaineet			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Kloridi	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfori	mg (mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Rauta	mg	7,92	1,19
Sinkki	mg	5,59	0,84
Kupari	mg	0,42	0,063
Mangaani	mg	0,029	0,004
Molybdeeni	µg	12,1	1,82
Seleeni	µg	17,7	2,66
Kromi	µg	14,0	2,10
Jodi	µg	97,9	14,7
Muut			
L-karnitiini	mg	10,1	1,52
Koliini	mg	146	21,9
Inositoli	mg	97,9	14,7
Tauriini	mg	30,0	4,50
Osmolaliiteetti	mOsm/kg H ₂ O		380