

TYR ANAMIX INFANT

Aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste tyrosanemian ruokavaliohoitoon imeväisille.

Jauhemainen aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste tyrosanemian (TYR) ruokavaliohoitoon. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien yhteen ikävuoteen asti. Soveltuu täydennysravinnoksi alle 3-vuotiaille.

TYR Anamix Infant sisältää välttämättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraattia, rasvaa, kuituja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Lisätty pitkäketjuisia rasvahappoja (LCP), arakinoidihappoa (ARA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA) rintamaitoa vastaavilla tasoilla.

- Ei sisällä fenyyialaniinia ja tyrosiinia.
- Lisätty prebioottisia oligosakkarideja GOS/FOS.

- rasvat auringonkukka-, kookos-, ja rapsiöljystä sekä Cryptocodium cohnii- ja Mortierella alpina -öljyistä, joissa on runsaasti ARA:a ja DHA:ta (44 E%)
- hiilihydraatit glukoosisiirapista (43 E%)
- 0,56 g ravintokuitua galakto-oligo- ja frukto-oligosakkarideista (GOS/FOS, 2 E%)



PER 100 ML

70 kcal energiaa

3,5 g rasvaa

7,5 g hiilihydraatteja

2,0 g proteiiniekvivalentteja

Ainesosat

Glukoosisiirappi, kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, kookos-, rapsi- ja auringonkukkaöljy), galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), L-lysiini-L-glutamaatti, L-leusiini, L-proliini, L-arginiini, L-valiini, L-isoleusiini, gliysiini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), L-asparagiinihappo, kalsiumfosfaatti, L-treoniini, L-seriini, L-alaniini, L-histidiini, kaliumsitraatti, frukto-oligosakkaridit, kaliumkloridi, L-kystiini, koliinibitartraatti, L-tryptofaani, magnesiumasetaatti, kalsiumglyserofosfaatti, natriumvetyfosfaatti, L-metioniini, *Cryptothecodinium cohnii* -öljy, *Mortierella alpina* -öljy, natriumkloridi, L-glutamiini, inosoli, L-glutamiinihappo, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoaineet (aurionkukkalesitiini, askorbyylipalmitaatti, DL- α -tokoferoli), tauriini, ferrosulfaatti, sinkkisulfaatti, L-karnitiini, DL- α -tokoferyyliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, retinyyliasetaatti, kaliumjodidi, mangaanisulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, fytomenadioni, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

Gluteeniton. Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa.

Makuvaihtoehdot

Neutraalinmakuinen

Käyttö

Imeväisen kliininen ravintovalmiste tyrosinemian (TYR) ruokavalihoitoon. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien 1-ikävuoteen saakka. Voidaan käyttää myös täydennysravintovalmisteena 3-vuotiaaksi.

Annostus

Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määrittyy potilaan iän, painon ja sairaustilan pohjalta.

Huomioitavaa

Tuotetta on täydennettävä luonnollisella proteiinilla, kuten esimerkiksi rintamaidolla tai sopivalla äidinmaidonkorvikkeella hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaisesti, fenyyylialaniinia ja tyrosiinia sisältävien proteiininlähteiden korvaamiseksi. Ei parenteraaliseen käyttöön ja ei sovellu ainoaksi ravinnoksi.

Valmistus

Käytä aina pakkauksen mukana olevaa mittalusikkaa oikean annoksen saamiseksi. Lisää jokaista mittaussusikkaa kohden (5 g) 30 ml vettä suositellun laimennuksen saavuttamiseksi (15 % paino/kokonaismäärä).

Laimeampi sekoitussuhde alussa saattaa olla tarpeen hyvän toleranssin varmistamiseksi. Jauhe ei ole steriili, joten se on valmistettava välittömästi ennen syöttämistä. Seosta ei saa keittää tai lämmittää mikroaaltouunissa. Seos, jota ei syödä tunnin kuluttua valmistamisesta, on heitettävä pois.

1. Pese kädet ja puhdista valmistusalue. Steriloi pullot ja tutit.

2. Keitä tuoretta vettä 5 minuutin ajan tai kunnes vedenkeitin sammuu (älä koskaan käytä lämmintä vesijohtovettä). Yli vuoden ikäisille lapsille vettä ei ole tarpeen kiehua, jos veden laatu on hyvä. Jauhe liukenee parhaiten lämpimään veteen.

3. Jäähdytä vettä vähintään 30 minuutin ajan kunnes se tuntuu ranteen sisäpuolelle mitattuna sopivalta. Kaada haluttu vesimäärä steriloi tuun tuttipulloon tai astiaan.

4. Lisää veteen suositeltu mittalusikkamäärä jauhetta.

5. Ravista tai sekoita vispilällä, kunnes jauhe on liennut.

6. Tarkista seoksen oikea lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteen sisäpuolelle. Vesi tai muut laimennetut juomat tulisi nauttia samanaikaisesti.

Säilytys ja säilyvyys

Avattu pakkaus käytettävä 2 viikon sisällä. Säilytä kuivassa ja viileässä poissa suoralta auringon valolta. Sulje purkki kannella käytön jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkaus

Kansi on helppo avata ja sulkea uudestaan. Jätelajittelu: Jauheimaisten valmisteiden purkit lajitellaan keräysmetalliin. Muovikannet hävitetään polttokelpoisena jätteenä. Ulkokartongit kuuluvat keräyskartonkiin.

Korvattavuus

Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

Tilattavissa Tamrosta.

Tilausnumero	Tuote	Myyntiyksikkö
2396638	TYR Anamix Infant	400 g

Ravintosisältö			
		Per 100 g	Per 100 ml 15 % laimennos
Energia	kJ	1950	293
	kcal	466	70
Rasva 44 E%		g	23,0
- tyydytynyttä	g	7,7	1,2
- kertytytymätöntä	g	11,3	1,7
- monitytymätöntä	g	4,0	0,6
-- linolihappo (LA)	g	3,21	0,481
-- alfaolenihappo (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonihappo (AA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaenihappo (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-suhde		7,66:1	
Hiilihydraatit 43 E%		g	50,1
- sokereita	g	7,5	1,1
Ravintokuitu 2 E%		g	3,7
- liukoinen	g	3,7	0,56
- liukenematon	g	0	0
Proteiiniekvivalentti 11 E%		g	13,1
Suola		g	0,48
Aminohapot			
L-alaniini	g	0,68	0,102
L-arginiini	g	1,19	0,179
L-asparagiinihappo	g	1,00	0,150
L-kystiini	g	0,45	0,0675
L-glutamiinihappo	g	1,34	0,201
L-glutamiini	g	0,13	0,0195
Glysiini	g	1,07	0,161
L-histidiini	g	0,68	0,102
L-isoleusiini	g	1,07	0,161
L-leusiini	g	1,83	0,275
L-lysiini	g	1,24	0,186
L-metioniini	g	0,29	0,0435
L-fenyylialaniini	g	Ei sisällä	Ei sisällä
L-proliini	g	1,30	0,195
L-seriini	g	0,80	0,120
L-treoniini	g	0,89	0,134
L-tryptofaani	g	0,36	0,054
L-tyrosiini	g	Ei sisällä	Ei sisällä
L-valiini	g	1,17	0,176
Vitamiinit			
A-vitamiini	µg	408	61,2
D ₃ -vitamiini	µg	11,2	1,68
E-vitamiini	mg (mg TE)	11,5 (9,23)	1,73 (1,38)
K-vitamiini	µg	37,3	5,59
C-vitamiini	mg	48,9	7,34
Tiamiini	mg	0,51	0,08
Riboflaviini	mg	0,51	0,08
Niasiini	mg (mg NE)	2,33 (8,83)	0,35 (1,25)
Pantoteenihappo	mg	2,81	0,42
B ₆ -vitamiini	mg	0,51	0,08
Foolihappo/Folaatti	µg	55,0/91,7	8,25/13,8
B ₁₂ -vitamiini	µg	1,21	0,18
Biotiini	µg	18,2	2,73
Kivennäisaineet			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Kloridi	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfori	mg (mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Rauta	mg	7,92	1,19
Sinkki	mg	5,59	0,84
Kupari	mg	0,42	0,063
Mangaani	mg	0,029	0,004
Molybdeeni	µg	12,1	1,82
Seleeni	µg	17,7	2,66
Kromi	µg	14,0	2,10
Jodi	µg	97,9	14,7
Muut			
L-karnitiini	mg	10,1	1,52
Koliini	mg	146	21,9
Inosoli	mg	97,9	14,7
Tauriini	mg	30,0	4,50
Osmolaliiteetti	mOsm/kg H ₂ O		380

Nutrician valmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, joita käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjeiden mukaan.

Nutricia c/o Danone Oy | Puh 02 274 4111 | nutriciasuomi@danone.com | ammattilaiset.nutricia.fi