

XPHEN TYR TYROSIDON

Kliininen ravintovalmiste tyrosinemian ruokavaliohoitoon.

Jauhemainen aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste tyrosinemian (TYR) ruokavaliohoitoon. Soveltuu kaikenikäisille, ei ainoaksi ravinnonlähteeksi.

Sisältää välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja. Ei sisällä fenyyialaniinia ja tyrosiinia.



PER 100 ML

326 kcal energiaa

0 g rasvaa

4,5 g hiilihydraatteja

77 g proteiiniekvivalenteja

Ainesosat

L-lyysiini, L-glutamaatti, L-leusiini, L-proliini, L-arginiini, L-valiini, L-isoleusiini, glysiini, L-aspartiinihappo, L-treoniini, L-seriini, kuivattu glukosisiirappi, L-alaniini, L-histidiini, L-kystiini, L-tryptofaani, L-metioniini, L-glutamiini, L-glutaminihappo, trikalsiumfosfaatti, tauriini, L-karnitiini.

Käyttö

Imeväisen kliininen ravintovalmiste tyrosinemian (TYR) ruokavaliohoitoon, kun plasman metioniinipitoisuus on normaali. Soveltuu imeväisille, lapsille ja aikuisille.

Annostus

Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määrätty potilaan iän, painon ja sairaustilan pohjalta.

Huomioitavaa

Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön. Käytettävä lääkärin valvonnassa. Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Lisäksi potilaan ruokavaliota täydennetään proteiineilla fenyyialaniinin ja tyrosiinin saamiseksi sekä muilla ravintoaineilla tarpeen mukaisesti.

Valmistus

Lisää ensin pieni osa vedestä tarvittavaan määrään jauhetta kunnes valmiste on tahnamaista, ja lisää tahna loppuosaan vettä. Suositeltu laimennos 1:20 (esim. 1 g jauhetta ja 20 ml vettä).

Osmolaliteetti: 5 % liuos (esim. 1 g jauhetta ja 20 ml vettä) = 370 mOsm/kg. Laimennos on viitteellinen. Voidaan annostella vahvempanakin, esim. tahnana tai juomana, mutta samalla nautittava vettä tai laimennettuja juomia. Valmis annos säilyy jääkaapissa korkeintaan 24 tuntia. Ravista tai sekoita välittömästi ennen käyttöä.

Säilytys ja säilyvyys

Säilytä kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä. Avattu purkki suljetaan hyvin muovikannella. Avattu pakkaus suljettava hyvin käytön jälkeen ja käytettävä kuukauden kuluessa.

Pakkaus

Kansi on helppo avata ja sulkea uudestaan. Jätelajittelu: Jauhemaisten valmis-teiden purkit lajitellaan keräysmetalliin. Muovikannet hävitetään polttokelpoisena jätteenä. Ulkokartongit kuuluvat keräyskartonkiin.

Korvattavuus

Synnyttäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

Tilattavissa Tamrosta.

Ravintosisältö

		Per 100 g
Energia	kJ	1386
	kcal	326
Rasva	g	0
- tyydyttyntä	g	0
Hiilihydraatit	g	4,5
- sokereita	g	0,4
Ravintokuitu	g	0
Proteiiniekvivalentti	g	77
Suola	g	<0,05
Aminohapot		
L-alaniini	g	4,10
L-arginiini	g	7,16
L-aspartiinihappo	g	5,98
L-kystiini	g	2,66
L-glutamiinihappo	g	8,04
L-glutamiini	g	0,81
Glysiini	g	6,40
L-histidiini	g	4,09
L-isoleusiini	g	6,40
L-leusiini	g	10,97
L-lyysiini	g	7,46
L-metioniini	g	1,75
L-fenyyialaniini	g	Ei sisällä
L-proliini	g	7,77
L-seriini	g	4,79
L-treoniini	g	5,38
L-tryptofaani	g	2,15
L-tyrosiini	g	Ei sisällä
L-valiini	g	6,99
Kivennäisaineet		
Natrium	mg (mmol)	<20 (<0,9)
Kalsium	mg (mmol)	126 (3,1)
Fosfori	mg (mmol)	65 (2,1 PO ₄)
Muut		
L-karnitiini	g	0,06
Tauriini	g	0,12

Tilausnumero	Tuote	Myyntiyksikkö
1610245	XPHEN TYR Tyrosidon	500 g