



**LETKU-
RAVITSEMUKSEN
KOTIHOITO-OPAS
LAPSIPERHEELLE**

HOITOTIETOJA

Nimi _____

Syöttöreitti _____

Syöttöletku: (ruksaa ja täytä käytössä olevan laitteen tiedot)

PEG-letku (merkki, paksuus, stoomakanavan pituus)

Gastrostomialetku (ballongillinen syöttöletku)
(merkki, paksuus, stoomakanavan pituus)

Syöttönappi (merkki, paksuus, pituus)

Käytössä oleva nappisyöttöletku

Syöttöpumppu:

Flocare Infinity -syöttöpumppu käytössä

Ravinnonsiirtolaite: (ruksaa käytössä oleva malli)

589755 Flocare universaali ravinnonsiirtolaite käsivaraiseen annosteluun

Flocare Infinity -pumppusiirtolaite

589825 universaali pumppusiirtolaite – sopii myös pulloon

586514 pumppusiirtolaite

586520 reppusiirtolaite, välttämätön, jos käytössä
Flocare Infinity Go -reppu (ks. sivu 12)

Lisäksi:

Säiliösiirtolaite veden annosteluun (ruksaa oikea malli, jos käytössä)

589785 Flocare-säiliö käsivaraiseen annosteluun, 2 l

590068 Flocare-säiliö Infinity-pumppuun, 2 l

Muut välineet tarpeen mukaan:

ENFit-oraaliruiskut, desinfioivaa ainetta, käsihuuhdetta,

pH-indikaattoripapereita, muuta _____

Letkuravintovalmiste

Letkuravintovalmiste (nimi) _____

Vuorokausiannos (ml/vrk) _____

Syöttömenetelmä

Jatkuva syöttö

Annossyöttö

Annostelu

Annostelunopeus ml/tunti _____ tai

tippaa/minuutti _____ (= _____ tippaa/15 sekuntia)

(1 ml letkuravintovalmistetta \approx 20 tippaa)

Lisäneste ml/vrk _____

Ravinnon antoajat

valmistemäärä (ml)

lisänesteen määrä (ml)

klo _____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

Lääkkeen antoajat

lääke

lisäneste (ml)

TARKISTUSLISTA

Tarkista, että kotiutusvaiheessa on huomioitu seuraavat asiat:

1. Tarvittavat todistukset

- B-todistus Kelalle
- Resepti letkuravintovalmisteista
- Hoitotarvikelähete hoitotarvikejakeluun
 - Ravinnonsiirtolaite (käsivarainen tai pumppu, jos pumppu käytössä)
 - Siirtolaite veden annosteluun
 - Nappisyöttöletku, jos käytössä syöttönappi
 - Varasyöttöletku, letkun rikkoutumisen varalta
 - Ruiskut

2. Lapsen vanhemmille/huoltajille mukaan

- Letkuravitsemuksen kotihoito-oppaan informaatio sivu (s. 2-3) ja yhteystiedot täytettyinä (s. 18)
- Syöttöletkun hoito-ohjeet
- Lisäksi varataan mukaan viikon tarve
 - Letkuravintovalmistetta
 - Ravinnonsiirtolaitteita
 - Tarvittavat puhdistusvälineet
 - Ruiskut

3. Lapsen vanhempien/huoltajien ohjaus

- Letkuravitsemuksen käytännön toteuttaminen
- Syöttötekniikka käsivaraisella siirtolaitteella sekä syöttöpumpun avulla, jos pumppu käytössä
- Käytännön ohjeita (esim. ruokailuasento, letkun sijainnin tarkistus, lääkkeiden anto, syöttöletkun hoito)
 - Mitä tehdä, jos esimerkiksi letku tukkeutuu tai irtoaa paikoiltaan
 - Hygienia
 - Letkuravintovalmisteen säilyvyys
 - Välineistön käsittely ja vaihtoväli

SISÄLTÖ

Hoitotietoja.....	2
Tarkistuslista.....	4
1. Letkuravitsemuksen toteutus kotona.....	6
2. KELA maksaa korvausta letkuravintovalmisteista.....	7
3. Hygienia.....	8
4. Letkuravitsemuksen toteuttaminen	9
Käyttöohjeet kuvina.....	10
Letkuravinnon anto Flocare-siirtolaitteen avulla	11
5. Flocare Infinity -syöttöpumpun käyttäminen.....	12
6. Ravitsemusavanne Flocare-laitteistoa käytettäessä.....	13
7. Kuinka hoidan syöttöletkua.....	14
8. Mitä tehdä syöttöletkulle, jos... ..	15
9. Ravitsemusavanteen hoito.....	16
10. Suun ja hampaiden hoito.....	16
11. Yleisohjeita, joita tarvitset, jos... ..	17
Yhteystiedot	18

1. LETKURAVITSEMUKSEN TOTEUTUS KOTONA

Letkuravitsemuksella turvataan lapsen ravinnonsaanti, kun tavallista ruokaa ei pystytä syömään riittävästi. Ravinto annetaan tällöin syöttöletkun kautta joko suoraan mahalaukkuun tai ohutsuoleen (syöttöletku = nenän kautta menevä letku tai vatsanpeitteiden läpi asennettava PEG, gastrostomialetku tai nappi). Letkuravitsovalmisteesta lapsi saa kaiken päivittäin tarvittavan ravinnon, lisäksi tarvitaan vain vettä. Lapsi voi halutessaan juoda lisänestettä suun kautta, ellei sairaus sitä estä.

Letkuravitsemusta voidaan käyttää myös muun ravinnonsaannin tukena. Päivällä lapsi voi syödä normaalisti niin paljon kuin jaksaa ja pystyy, ja vuorokautinen ravinnontarve täytetään letkuravinnolla esimerkiksi yön aikana tai muun ruokailun yhteydessä. Ruokavaliohoidon tarkoituksena on, että lapsi siirtyy vähitellen syömään riittävästi tavallista ruokaa, tai täydentämään loput ravinnonsaannista käyttämällä täydennysravintovalmisteita.

Letkuravitseminen voidaan toteuttaa sairaalan ulkopuolella kotiloissa, ulkoillessa, päiväkodeissa ja kouluissa. Letkuravitsemuksen onnistumisen perustana kotona on hyvä hoidonohjaus, joka annetaan sairaalassa ennen kuin lapsi kotiutetaan. Iästä riippuen lapsi itse tai joku hänen perheenjäsenistään, läheisistään tai hoitajistaan opetetaan antamaan päivittäinen ravinto ja huolehtimaan välineistöstä.

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa lapselle/nuorelle ja häntä hoitaville henkilöille käytännön ohjeita eri tilanteista selviytymiseen.

Oppaan esimerkit mm. syöttöletkun huuhteluun käytettävästä nestemäärästä ovat viitteellisiä. Pienten lasten kohdalla tulee myös letkun huuhteluun käytettävän nesteen määrä sovittaa yksilöllisesti terveydenhuoltohenkilökunnan antamiin hoito-ohjeisiin.

2. KELA MAKSAA KORVAUSTA LETKURAVINTOVALMISTEISTA

Letkuravintovalmisteet kuuluvat sairausvakuutuslain mukaan Kansaneläkelaitoksen (KELAn) korvauksien piiriin henkilöille, jotka tarvitsevat useiden viikkojen ajan päivittäistä letkuravitsemusta. Hoitava lääkäri kirjoittaa lääkärinlausunnon (B-lausunnon) ja reseptin valmisteesta, joka vastaa parhaiten lapsen tarpeita.

B-lausunto

- Vie tai lähetä B-lausunto KELAn paikallistoimistoon heti, sillä ravintovalmisteet korvataan siitä päivästä lähtien, kun KELA kirjaa B-lausunnon saaduksi.
- Erityiskorvausoikeudesta tehdään merkintä lapsen KELA-korttiin, jonka jälkeen ravintovalmisteet saadaan suoraan apteekista erityiskorvattuina.

Resepti

- Letkuravintovalmisteet ostetaan apteekista reseptillä.
- Ostoista on mahdollisuus saada erityiskorvaus siitä päivästä alkaen, kun lääkärinlausunto B on saapunut KELAan.
- Kun vuotuinen omavastuuosuus KELAn korvaamista lääkkeistä ja ravintovalmisteista on täyttynyt, maksetaan ravintovalmisteista ostokertaa kohden lääkekohtainen omavastuu. KELA seuraa kustannuksia ja lähettää ilmoituksen, kun omavastuuosuus on ylittynyt. Korvauksen saamista varten kuitit on säilytettävä. Letkuravintovalmisteita käyttävällä lapsella saattaa lisäksi olla oikeus vammaistukeen tai vammaispalvelulain mukaisiin korvauksiin. Lisätietoja näistä saa sairaalan sosiaalityöntekijältä tai KELA:sta (<https://www.kela.fi/vammaistuet>).
- Ainoastaan teollinen letkuravintovalmiste on KELA-korvattava.

Välineistön saatavuus

Letkuravitsemukseen tarvittavat välineet saat joko kotisairaanhoidon, kunnan hoitotarvikejakelun tai sairaalan kautta. Hoitotarvikelähete lähtee kirjallisena hoitavasta yksiköstä lapsen lähimpään hoitotarvikejakelupisteeseen.

Tarkista asia hoitopaikasta (s. 18).

3. HYGIENIA

Ravintovalmisteen säilytys

- Säilytä avaamattomat ravintovalmistepakkaukset auringolta suojattuina normaalisissa huoneenlämmössä.
- Lue aina huolellisesti tuotekohtainen ravintovalmisteen käyttöohje ennen tuotteen käyttöä. Etiketistä löydät tuotekohtaiset käyttöominaisuudet.
- Säilytä avatut ravintovalmistepakkaukset hyvin suljettuina jääkaapissa korkeintaan 24 tuntia.
- Nutrician muovipakkauksiin pakatut letkuravintovalmisteet säilyvät 24 tuntia huoneenlämmössä, jos ravinnonsiirtolaite ei irroteta pakkauksesta. Näin bakteereja ei pääse valmisteeseen. Infatrini-pullo enintään 4 tuntia.
- Letkuravintovalmiste on ravitsemuksellisesti täysipainoista ruokaa. Sitä ei kuumenneta, eikä sitä saa laimentaa.

Parasta ennen -päiväys

- Tarkista parasta ennen -päiväys ennen kuin avaat pakkauksen. Päivämäärä on painettu pakkauksen päälle. Tarvittaessa soita yhteyshenkilöllesi (s. 18).

Puhtaat kädet ja pöytätasot

- Pese kädet huolellisesti ja desinfioi apteekista saatavalla käsihuuhteella ennen kuin avaat ravintovalmistepakkauksen.
- Pyyhi pöytä tai taso, jonka päällä käsittelet ravintovalmistettä ja välineitä, tai suojaa taso talouspaperilla.

Välineistön käsittely

- Poistettuasi suojakorkit vältä koskettelemasta käsin ravinnonsiirtolaitteen ja letkun liittimiä. Varo, ettei mikään välineistä putoa lattialle.
- Nutrician muovipakkauksen (500 ml & 1 l) suuta ei tarvitse puhdistaa ennen käyttöä. Pullopakkauksissa, joiden päällä on folio, suu tulee pyyhkiä aina desinfioivalla aineella (ei käsihuuhteella) ennen sen liittämistä ravinnonsiirtolaitteeseen.

Huomio! Älä annostelee syöttöletkuun muuta ruokaa kuin letkuravintovalmistettä syöttöletkun tukkeutumisen estämiseksi.

Vesi

- Käytä syöttöletkun huuhteluun ja nesteliseksi juuri keitettyä ja jäähdytettyä vesijohtovettä tai steriiliä vettä. Voit myös käyttää hyvälaatuista kylmää vesijohtovettä, jonka annat lämmitettyä suljetussa astiassa huoneenlämpöiseksi. Paikkakunnan veden laadun voit tarkistaa kunnan/kaupungin terveystarkastajalta. Lisänesteen tarpeen näet sivulta 3.

Ravinnonsiirtolaite ja säiliöt

- Vaihda ravinnonsiirtolaite kerran vuorokaudessa. Jos käytät lisäksi säiliösiirtolaite veden annosteluun, se tulee vaihtaa viikon välein.


4. LETKURAVITSEMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Flocare-ravinnonsiirtolaitteen yhdistäminen Nutrician letkuravintovalmistepakkaukseen

1. Pese kädet huolellisesti ja desinfioi käsihuuhteella.
2. Tarkista syöttöletkun paikka (ks. s. 14).
3. Kääntelee letkuravintopakkausta muutama kerta ylösalaisin, jotta valmiste sekoittuu.
4. Avaa uusi Flocare ravinnonsiirtolaite -pakkaus.

FLOCARE UNIVERSAALI RAVINNONSIIRTOLAITE

1. Ravinnonsiirtolaitteen ja ravintovalmisteiden yhdistäjäosa
2. Lilakauluksinen pulloon sopiva adapteri
3. Pullon ripustin
4. Rullasulkija
5. Lääkkeenantohaarake
6. Suojakorkki



KUN KÄYTÖSSÄ ON NUTRICIAN MUOVIPAKKAUS




- Avaa korkki.



- Kiinnitä ravinnonsiirtolaitteen yhdistäjäosa (1) pakkaukseen.



- Kierrä siirtolaite tiukasti kiinni.




- Käsivaraisella ravinnonsiirtolaitteella annosteltaessa tarkista, että ravinnonsiirtolaitteen rullasulkija (4) on kiinni.



- Ripusta pakkauksen pohjasta telineeseen.

Jätä Flocare-ravinnonsiirtolaite kiinni pakkaukseen, jos keskeytät ruokinnan päivällä tai yön ajaksi. Sulje ravinnonsiirtolaitteen syöttöletkun puoleinen pää suojakorkilla (6). Tällä tavoin letkuravintovalmiste säilyy 24 tuntia huoneenlämmössä. Jos ravinnonsiirtolaite irrotetaan ravinnonannon välillä, tulee valmiste säilyttää jääkaapissa (max. 24 h).

KUN KÄYTÖSSÄ ON NUTRICIAN PULLOPAKKAUS



- Aseta valkoinen ripustin (3) pulloon.
- Kierrä korkki auki.
- Kierrä ravinnonsiirtolaitteen lila pulloon sopiva adapteri (2) ravinnonsiirtolaitteen lilaan korkkiosaan (1).
- Kierrä ravinnonsiirtolaite tiiviisti paikalleen pulloon. Pulloadapterin pieni terä rikkoo pullonsuun folion automaattisesti.
- Käsivaraisella ravinnonsiirtolaitteella annosteltaessa tarkista, että ravinnonsiirtolaitteen rullasulkija on kiinni.
- Käännä pullo ylösalaisin ja ripusta se telineeseen.

HUOM!
Pullopakkauksesta letkuravintovalmistetta annosteltaessa tiputusaika ei saa ylittää 4 tuntia hygieniasyistä. Avattuna säilytettävä jääkaapissa (max 24 h).

LETKURAVINNON ANTO FLOCARE-SIIRTOLAITTEELLA

KUN KÄYTÖSSÄ ON INFINITY-SYÖTTÖPUMPPU

Flocare Infinity -pumppusiirtolaiteen täyttämisen:

- Tarkista, että letkuravintovalmiste on hieman pumppua ylempänä tai käytä laitteistolle tarkoitettua telinettä
- Pumppaa tippakammioon pari painallusta ravintovalmistetta
- Täytä Ravinnonsiirtolaite Fill Set -toimintoa käyttämällä

Annostelun aloittaminen:

- Ennen kuin aloitat syötön, huuhtelet syöttöletku vedellä (n. 10–40 mm)
- Liitä ravinnonsiirtolaite syöttöletkuun
- Ohjelmoi annostelu ja käynnistä pumppu

Ravintovalmistepakkauksen vaihtaminen:

- Pysäytä pumppu vaihdon ajaksi
- Huuhtelet letku 10–40 ml vedellä
- Liitä uusi ravintovalmistepakkaus heti siirtolaitteeseen tyhjentyneen pakkauksen tilalle
- Täytä tarvittaessa siirtolaite Fill set -toiminnosta
- Käynnistä pumppu (asetukset säilyvät muistissa)

Siirtolaitteiden tilavuus on 18 ml, reppusiirtolaiteen 14 ml.

KÄSIVARAISESTI

(käsivaraisen ravinnonsiirtolaitteen kuva s. 9).

Flocare-siirtolaitteen täyttäminen:

- Tarkista, että ravintovalmistepakkaus on ripustettu vähintään noin metrin verran syöttöletkun päätä korkeammalle
- Tarkista, että lääkkeenantohaarake ja rullasulkija ovat kiinni
- Pumppaa tippakammioon pari painallusta ravintovalmistetta (enintään puolilleen)
- Avaa rullasulkija ja täytä siirtolaite kokonaan letkuravintovalmisteella
- Sulje rullasulkija

Annostelun aloittaminen:

- Ennen kuin aloitat syötön, huuhtelet syöttöletku vedellä (n. 10–40 ml)
- Liitä ravinnonsiirtolaite syöttöletkuun
- Avaa rullasulkija
- Säädä annostelunopeus halutuksi rullasulkijalla

Ravintovalmistepakkauksen vaihtaminen:

- Sulje rullasulkija
- Huuhtelet letku 10–40 ml vedellä
- Liitä uusi ravintovalmistepakkaus heti siirtolaitteeseen tyhjentyneen pakkauksen tilalle
- Aloita ravinnonanto avaamalla rullasulkija ja säädä annostelunopeus sopivaksi

HUOM! Letkuruokinta-asento

- Voit pitää lasta sylissä ruokinnan ajan
- Sängyssä ollessa on hyvä kohottaa lapsi puoli-istuvaan asentoon esim. parin tyynyn avulla. Jos lapsi pystyy liikkumaan, voidaan letkuravitus toteuttaa istuen tai seisten. Letkuruokintareppu mahdollistaa muunkin liikkumisen.
- Säilytä kohoasento vielä noin puoli tuntia letkuruokinnan lopettamisen jälkeen.

5. FLOCARE INFINITY -SYÖTTÖPUMPUN KÄYTTÄMINEN

Syöttöpumppu annostelee letkuravinnon tasaisesti säädetyllä nopeudella. Tästä on suurta hyötyä esim. pieniä annoksia annettaessa tai oksentelevilla lapsilla. Syöttöpumpun käyttäminen on myös helppoa ja se antaa turvallisuutta ja varmuutta letkuravitseemukseen. Annostelunopeuden voit säätää helposti muutamalla napin painalluksella. Syöttöpumpun avulla annosmäärät ovat myös tarkkoja eikä ole vaaraa, että tulee yli- tai aliannostuksia. Syöttöpumpun käyttö jättää aikaa muulle yhdessäololle.

Flocare Infinity -syöttöpumppu on pienikokoinen ja kevyt, joten sitä voidaan kuljettaa myös mukana Flocare Infinity Go -reppussa (saatavana erikseen).

Perehdy tarkoin erilliseen Infinity-syöttöpumpun käyttöohjevihkoseen ennen kuin aloitat syöttöpumpun käytön. Käytä ainoastaan Flocare Infinity -pumppusiirtolaitetta. Infinity-syöttöpumpun käyttöohjevihkosen sivulla 16 on tarkka kuvaus siitä, kuinka ravinnonsiirtolaite asetetaan Infinity-syöttöpumppuun. Toimi muutoin kuten kohdassa 4. *Letkuravitsemuksen toteuttaminen* sivulta 9 alkaen.



6. RAVITSEMUSAVANNE FLOCARE-LAITTEISTOA KÄYTETTÄESSÄ


Toteuta lapsen letkuravitsemus ravinnonsiirtolaitteen avulla kuten sivulla 11 on esitetty.

Erilaisia vaihtoehtoja letkuravitsemuksen toteuttamiseen

- Flocare PEG -letku tai Flocare-gastrostomialetku, jonka pää pysyy mahalaukussa pidikelevyn tai vedellä täytetyn ballongin avulla.
- Flocare Bengmark PEG/J -letku, jolloin letkun pää on pohjukais- tai ohutsuolessa. Annostele letkuravinto jejunostomiaan aina hitaasti ja jatkuvana tiputuksena siirtolaitteen avulla, mieluiten syöttöpumppua apuna käyttäen.
- Syöttönappi, jolla tarkoitetaan lyhyttä, mahalaukusta ihon pinnan tasolle ulottuvaa letkua. Sitä pitää paikallaan vedellä täytetty ballonki ja ruokintaa varten siihen liitetään aina erillinen nappisyöttöletku.

Kysy hoitohenkilökunnalta laitteistoon liittyviä lisäohjeistuksia.

Flocare PEG -letku



Flocare-gastrostomialetku



7. KUINKA HOIDAN SYÖTTÖLETKUA

Syöttöletkun paikan tarkistaminen

- Aina ennen letkuruokinnan aloittamista on tarkistettava, että syöttöletku on paikoillaan.
- Vedä ruiskuun syöttöletkun kautta hieman mahansisältöä ja tipauta siitä muutama pisara pH-indikaattoriliuskalle. Jos pH on alle 5, on syöttöletku mahalaukussa ja voit aloittaa letkuruokinnan.
- Tarkista pituusmerkinnöistä, että syöttöletku on samassa kohdassa kuin paikoilleen asetettaessa.
- Jos epäilet, että syöttöletku ei ole mahalaukussa, ota yhteyttä hoitopaikkaan syöttöletkun paikan varmentamiseksi.

Syöttöletkun huuhtelu

Syöttöletku tulee huuhdella säännöllisesti letkun tukkeutumisen estämiseksi. Syöttöletkun huuhtelemiseen käytetään n. 10–40 ml vettä (ks. s. 3) yksilöllisen tarpeen mukaan.

Huuhtele syöttöletku annettujen ohjeiden mukaisesti

- ennen ja jälkeen letkuravinnon antamisen
- jokaisen ravintovalmistepakkauksen vaihdon yhteydessä
- ennen ja jälkeen lääkkeiden ottamisen
- jos ruokinta keskeytyy jostain syystä
- päivittäin letkuruokinnan lopettamisen jälkeen

Vaikka syöttöletku ei olisikaan jokapäiväisessä käytössä, tulee se silti huuhdella päivittäin. Jos käytössä on syöttönappi, muista säilyttää nappisyöttöletkua ruokailun välillä pikasulkija auki -asennossa.

Lääkkeiden annostelu

Mikäli lääkkeitä ei pystytä nielemään, voidaan ne annostella syöttöletkun kautta. Annostelua varten tarvitet ruiskun. Valmiit liuokset, huhmaessa hienoksi jauhetut tabletit ja avattujen kapselien sisältö liuotetaan pieneen määrään vettä. Muista kaikissa hygieeninen käsittely. Tarkista lapsen hoitavalta lääkäriltä lääkkeiden paras annostelutapa.

1. Jos käytät syöttöpumppua, pysäytä se lääkkeiden antamisen ajaksi. Käsisivarisesti annosteltaessa sulje rullasulkija.
2. Avaa lääkkeenantohaarake ja huuhtelee syöttöletku n. 10–40 ml:lla vettä.
3. Ruiskuta lääkeeseos lääkkeenantohaarakkeen kautta syöttöletkuun.
4. Huuhtelee syöttöletku välittömästi n. 10–40 ml:lla vettä (yksilöllisen tarpeen mukaan).
5. Sulje lääkkeenantohaarake.
6. Aloita ravinnonanto avaamalla rullasulkijaa ja säädä annostelunopeus sopivaksi tai kytke syöttöpumppu päälle.

8. MITÄ TEHDÄ SYÖTTÖLETKULLE,

Jos syöttöletku tukkeutuu

- Vedä ruiskuun tukkeutuneen syöttöletkun sisältö. Kun ruiskuun tulee mahansisältöä, syöttöletku on avautunut. Huuhtelee syöttöletku vedellä ja jatka letkuravinnon annostelua.
- Ellei syöttöletku avaudu, soita hoitopaikkaan (ks. s. 18).

Jos syöttöletku irtoaa

Syöttönappi tai gastrostomialetku

- Jos syöttönappi tai gastrostomialetku irtoaa vahingossa, aseta välittömästi uusi nappi tai gastrostomialetku (samaa Ch-kokoa, s. 2) ravitsemusavanteeseen, ettei avanne sulkeudu. Jos uuden syöttönappin tai gastrostomialetkun asettamista ei ole opastettu, älä täytä ballonkia itse vaan ole yhteydessä sovittuun yhteyshenkilöön, ettei ravitsemusavanne vahingoitu.
- Varanappi tai gastrostomialetku on hyvä pitää aina mukana. Jos sinulla ei ole varaletkua, ota viipymättä yhteyttä hoitopaikkaan (ks. s. 18). Uuden letkun asennus on nopea ja vaivaton toimenpide, mikäli aukko ei ole umpeutunut.

Nenän kautta menevä syöttöletku (nenä-mahaletku)

- Älä yritä laittaa letkua takaisin paikoilleen, vaan soita hoitopaikkaan (ks. s. 18).

9. RAVITSEMUSAVANTEEN HOITO

Ravitsemusavanteeseen ja syöttöletkuun liittyvän erillisen ohjeen saat hoitajalta.

Jos ravitsemusavanteesta tulee eritettä

- Märkäisen näköistä eritettä voi ilmaantua ravitsemusavanteen juureen. Tämä on kehon puolustautumista vierasta materiaalia vastaan.
- Suihkuta ravitsemusavannetta ympäröivää ihoa vedellä useita kertoja päivässä ja kuivaa iho puhtaalla pyyhkeellä.
- Mikäli eritettä on niin paljon, että vaatteet tahriintuvat, voit suojata ravitsemusavanteen juuren kuivalla harsotaitoksella.

Jos mahansisältöä vuotaa letkun juuresta

- Ravitsemusavanne voi olla suurentunut. Ota yhteyttä hoitopaikkaan (ks. s. 18), joka arvioi tilanteen.

Jos PEGin ruokintayhdistäjä vuotaa juuresta tai korkista

- Vaihda uusi ruokintayhdistäjä tai ota yhteys hoitopaikkaan tai kotisairaanhoidtoon (ks. s. 18).

Jos ravitsemusavanteen ympäristö on kipeä

- Ravitsemusavanteen tekemisen jälkeen voi haavakipuun ottaa särkylääkettä. Jos kipu on pitkäaikaista ja voimakasta, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin (ks. s. 18).

10. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

Letkuravitsemuksessa syljen erityys vähenee, siksi suu voi lapsesta tuntua kuivalta.

Voit parantaa tilannetta seuraavasti:

- Harjaa lapsen hampaat kaksi kertaa päivässä hammastahnaa käyttäen.
- Kostuta lapsen suuta vedellä tai keinosyljellä.
- Rasvaa lapsen huulet päivittäin.
- Jos mahdollista, anna lapselle ksylitolimakeisia tai -purukumia.
- Jos sallittua, voit laittaa lapsen kielen päälle vähän teelusikalla erilaisia makuja, jotka lisäävät syljen eritystä (esim. makeaa, hapanta, kylmää).

11. YLEISOHJEITA, JOITA TARVITSET, JOS...

Syöttöpumppu ei toimi

- Käy läpi vianetsintätaulukko syöttöpumpun käyttöohjevihkosta. Muussa tapauksessa ole yhteydessä hoitopaikkaan (s. 18).

Ravinnonsiirtolaite tai säiliö on viallinen

- Jos siirtolaite tai säiliö vuotaa, tarkista, että olet seurannut pakkauksessa olevia ohjeita.
- Jos siirtolaite tai säiliö on selvästi viallinen, säilytä se tarkistusta varten ja ole yhteydessä hoitopaikkaan (s. 18).

Ravintovalmisteessa on jotain vikaa

- Jos pakkaus on vioittunut tai ravintovalmiste on kokkareista, älä käytä sitä, vaan ota uusi pakkaus. Säilytä viallinen tuote jääkaapissa suljettuna ja ota yhteyttä sen myyntipisteeseen (s. 18).

Olo tuntuu epämiellyttävältä ja täydeltä

- Jos lapsen olo tuntuu epämiellyttävältä ja täydeltä ruokinnan aloittamisen jälkeen, ole yhteydessä hoitopaikkaan (s. 18).

Jos lapsella on seuraavia oireita

- vatsakipuja
- pahoinvointia tai oksentelua tai pulauttelua
- ripulia
- ummetusta
- lämpöä
- jos ravinnonsaanti jää useana päivänä suunniteltua vähäisemmäksi
- tai jos paino laskee

...tai jos ilmenee muita ongelmia, ole yhteydessä hoitopaikkaan.

YHTEYSTIEDOT

Nimi/Puhelinnumero

Ota yhteyttä liittyen

Hoitava lääkäri

Ravitsemusterapeutti

Sairaanhoitaja/yhteyshenkilö

Sairaalan sosiaalityöntekijä

Hoitotarvikejakelu

Osasto/poliklinikka



Nutrician letkuravintovalmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, jotka on tarkoitettu sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon. Esite on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstön kautta jaettavaksi perheille.